

梅毒症狀及早發現及早治療

梅毒主要透過不安全性行為、
血液接觸，或母子垂直感染傳播

感染初期，常見症狀包括：

生殖器潰瘍

梅毒疹

掉髮

身體紅疹

如果沒有及時治療，可能影響身體健康，甚至造成嚴重併發症

預防方式：

- ✚ 性行為全程使用保險套
- ✚ 定期篩檢
- ✚ 避免多重性伴侶
- ✚ 與伴侶一起檢查與治療



Early detection and treatment of syphilis

Syphilis is mainly transmitted through unprotected sexual activity, contact with infected blood, or vertical infection from mother to child

Common symptoms in the early stages of infection:

Genital ulcers

Syphilitic rash

Hair loss

Red rashes on the body

If not immediately treated, syphilis can affect overall health and lead to serious complications

Prevention:

- ✚ Always use condoms when engaging in sexual activity
- ✚ Do not have multiple sexual partners
- ✚ Undergo regular screening
- ✚ Get tested and treated together with your partner

Gejala, Penemuan dan Pengobatan Dini Sifilis

Penularan utama dari penyakit sifilis (Raja Singa) adalah melalui hubungan seks yang tidak aman, kontak darah, atau infeksi vertikal ibu ke anak

Gejala tahap awal yang umum seperti:

Luka atau borok pada area kelamin

Ruam sifilis

Rambut rontok

Ruam merah pada tubuh

Jika tidak segera diobati maka mungkin akan memengaruhi kesehatan tubuh, bahkan menyebabkan komplikasi serius

Metode pencegahan:

✚ Menggunakan kondom selama melakukan hubungan seksual

✚ Melakukan pemeriksaan rutin

✚ Menghindari gonta-ganti pasangan seksual

✚ Melakukan pemeriksaan dan pengobatan bersama pasangan

Triệu chứng bệnh giang mai: Phát hiện sớm, điều trị kịp thời

Giang mai lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn, tiếp xúc với máu hoặc lây truyền dọc từ mẹ sang con.

Ở giai đoạn đầu, các triệu chứng phổ biến bao gồm:

Săng giang mai

Phát ban giang mai

Rụng tóc

Phát ban đỏ trên cơ thể

Nếu không được điều trị kịp thời, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí gây ra các biến chứng nguy hiểm.

Biện pháp phòng ngừa:

✚ Sử dụng bao cao su trong suốt quá trình quan hệ tình dục

✚ Tránh có nhiều bạn tình

✚ Xét nghiệm định kỳ

✚ Kiểm tra và điều trị cùng với bạn tình



โรคซิฟิลิส พบเร็ว รักษาได้

โรคซิฟิลิสติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
การสัมผัสเลือดที่มีเชื้อหรือการถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกระหว่างตั้งครรภ์

อาการที่พบบ่อยในระยะแรก ได้แก่

แผลที่อวัยวะเพศ

ผื่นซิฟิลิส

ผมร่วง

ผื่นแดงตามร่างกาย

หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

วิธีป้องกัน

- ✚ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
- ✚ ตรวจคัดกรองเป็นประจำ
- ✚ หลีกเลี่ยงการมีคู่นอนหลายคน
- ✚ ตรวจและรักษาพร้อมกับคู่นอน

